

新型コロナワクチン接種のご案内



下記のとおり、令和8年度新型コロナワクチンの接種を実施します。
ワクチンが無くなり次第終了となります。お早めに接種してください。



◆実施期間：令和8年10月1日(木)～令和9年1月29日(金)

◆実施場所：国保田野畑村診療所（☎0194-33-3101）

◆対象者と受付時間

①65歳以上の村民

②60歳～64歳の村民のうち対象となる人

…心臓・腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人

③村に住所を有する妊婦【任意接種】

※希望する人は主治医と相談のうえ接種してください。村診療所での接種のみ助成対象となります。

◇◆◇ 上記①～③の対象以外で接種を希望する人は全額自己負担となります ◇◆◇

対象	接種日	受付時間	予約の有無	料金
定期受診者 (定期処方がある人)	上記日程内の 定期受診日	診療時間内 ※受診時に接種可能	要予約 (受診予約の際に確認)	7,000円 (生活保護受給者は無料)
上記以外 (定期受診者以外)	上記日程内の 接種予約日	診療時間内 ※受診時に接種可能	要予約 (予約枠に空きがある場合)	

※詳細な日程及び予約については診療所にご確認ください。

◆予約方法

① 診療所へ電話(☎33-3101)で予約 ② 窓口で予約

◆持ち物

- ① 予診票 …予診票は診療所窓口にあります。接種前に記入ください。
- ② お薬手帳（お持ちの方のみ）
- ③ 予防接種手帳（65歳以上でお持ちの方のみ）
- ④ 接種料金

《村外の医療機関等での接種を希望される方へのご案内》

※ 事前に申請が必要です ※

【手続き方法】

- ①接種を希望する医療機関を予約する。
- ②はんこを持参し、保健センターで手続きをする。
- ③保健センターで発行する書類を、予約した医療機関に提出し接種する。

【補助額】

助成額：8,600円 差額は自己負担 となります。

（実施期間中に接種できなかった場合は、全額自己負担になります。）

【申請受付・助成期間】


令和8年10月1日(木)～令和9年2月26日(金)

《接種時及び感染症予防のお願い》

- ・診療所には具合の悪い人も来ております。診療所内では静かにお待ちください。
- ・感染症予防のため、診療所内でのマスクの着用と手指の消毒、換気にご協力をお願いします。
- ・ワクチンは感染を予防するものではありません。接種後も換気や手洗い等の感染対策を継続して行いましょう。



◆ 駐車場案内



- ・ 駐車場では左右を確認し、通行人や他の車にご注意ください。
- ・ 駐車場は2つあります。近隣の住宅敷地への駐車はご遠慮ください。



＊ ＊新型コロナワクチンの接種について＊ ＊

新型コロナワクチンの接種を実施するに当たって、健康状態をよく把握する必要があります。そのため、予診票に出来るだけ詳しくご記入ください。本人が自書出来ない場合は、健康状態をよく把握している方がご記入ください。

1、ワクチンの効果と副反応

効 果→ 新型コロナウイルス感染症の発症を予防したり、症状を軽くすることができます。

また、合併症や死亡を予防することが期待されます。

副反応→ 重大な副反応…ショック、アナフィラキシー様症状（蕁麻疹、呼吸困難、血管浮腫等）があり、そのほとんどは接種直後から30分以内に起こります。

局所症状…注射部位の発赤・腫脹・痛み、リンパ節の腫れ等、通常は2～3日で消失します。

全身症状…発熱、悪寒、頭痛、筋肉や関節の痛み等、通常は2～3日で消失します。

過敏症状…まれに、発疹、湿疹、紅斑、かゆみなどが起こります。

※このような症状が認められたり、疑われた場合は、すぐに医師に申し出てください。

※接種後に心筋炎や心膜炎が現れることがあります。胸の痛み、動悸、浮腫、息苦しさや息切れ等がある場合には速やかに医師の診察を受けてください。

2、予防接種を受けることができない者

- (1) 接種当日、明らかに発熱（37.5℃以上）がある人
- (2) 重篤な急性疾患にかかっている人
- (3) 本ワクチンの成分に対し、重度の過敏症の既往歴がある人
- (4) その他、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

3、予防接種を受ける際に注意を要する者

- (1) 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- (2) 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の人がいる人
- (3) 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- (4) 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性のアレルギーが疑われる症状が出た人
- (5) 過去にけいれんを起こしたことがある人
- (6) 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人
- (7) 腎機能障害のある人
- (8) 肝機能障害のある人

4、ワクチン接種後の注意

- (1) ワクチンの接種後30分は、急な反応が起きることがあります。様子を観察し、何かあった場合には、接種した医療機関とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。
- (2) 接種当日の入浴は差し支えませんが、注射した部位はこすらないようにしましょう。
ただし、体調が悪い場合は入浴を控えることも検討してください。
- (3) 接種後は、接種部位を清潔に保ち、過激な運動、大量の飲酒は避けましょう。
- (4) 万一、高熱やけいれん等の異常な症状が出た場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

